

ИНСТРУКЦИЯ

по применению пробиотической добавки «АТЫШ»
(водорастворимый концентрат) для собак.

СОСТАВ

В 1 г. содержится:

Enterococcus faecium — 4,0 миллиарда бактерий
(4×10^9 КОЕ),

Lactobacillus acidophilus — 20,0 миллион бактерий
(2×10^7 КОЕ),

Вспомогательное вещество — мальтодекстрин.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Оба штамма молочнокислых бактерий хорошо приживаются в кишечнике **собак**, нормализуя микрофлору животного. Проявляют выраженный антагонизм в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, в т.ч. эшерихий, сальмонелл, стафилококка, протей и др. Синтезируют витамины группы В, К и С, повышая тем самым резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Участвуют в метаболизме желчных пигментов и желчных кислот. Применение пробиотика с первого дня жизни питомца обеспечивает раннее заселение кишечника правильной микрофлорой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для собак (всех пород):

- в качестве иммуностимулирующего средства;
- при поражениях ЖКТ с симптомом диареи, отравлениях, микотоксикозах; после лечения антибиотиками, коксидиостатиками, антигельминтными препаратами;
- при беременности для получения здорового потомства;
- для предупреждения бактериальных осложнений при вирусных заболеваниях;
- повышение устойчивости к стрессу при переезде, в путешествиях и прочих стрессовых факторах;
- для улучшения состояния волосяного покрова питомца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Добавка «АТЫШ» растворяется в воде и выпивается индивидуально. Готовый раствор не использовать после 6 часов с момента приготовления.

Допускается добавка «АТЫШ» к сухому корму животного. Для этого достаточно присыпать корм

питомца данным порошком.

Дозировка, независимо от возраста и веса питомца, составляет 1 пакетик или 2 гр. один раз в сутки.

Для щенков можно поделить содержимое одного пакетика «АТЫШ» на пару приемов, но это не обязательное условие.

При поражениях ЖКТ с симптомом диареи длительность приема определяется индивидуально, курс лечения должен длиться до исчезновения симптомов.

В остальных случаях курс лечения - 10 дней.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не выявлены.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Нежелательных взаимодействий с другими лекарственными препаратами не отмечено. Молочнокислые бактерии не устойчивы к антибиотикам широкого спектра действия, поэтому целесообразно назначать «АТЫШ» после курса антибиотикотерапии.

ФОРМА ВЫПУСКА

«АТЫШ» упакован в саше-пакетик массой нетто 2 гр.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Для предупреждения гибели бактерий не разбавлять добавку в жидкости выше $+39^{\circ}\text{C}$. Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от -18°C до $+20^{\circ}\text{C}$.

СРОК ГОДНОСТИ

При (-18°C) – 24 месяца от даты изготовления;
При ($+4$ $+8^{\circ}\text{C}$) – 12 месяцев от даты изготовления;
При ($+20^{\circ}\text{C}$) – 3 месяца от даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «АГРОФЕДЕРАЦИЯ»,
450078, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Владивостокская 1а.
+7 (347) 216-37-32/31
e-mail: agrofed@yandex.ru